

**Программа проверки квалификации состава и свойств
зерна и зерновых культур**

Показатель	Диапазон
влажность	(1,0-70,0) %
массовая доля сырой клейковины	(1,0-75,0) %
азот	(1,0-10,0) %
белок	(1,0-10,0) %
жирнокислотный состав жировой фазы	(0-100,0) %
зола	(3,00-15,0) %
кальций	(0,10-10,0)%
фосфор	(0,10-10,0)%
калий	(0,10-10,0)%
сахар	(0,10-10,0)%
крахмал	(0,10-10,0)%
цинк	(0,10-10,0)%
марганец	(0,10-10,0)%
медь	(0,10-10,0)%
железо	(0,10-10,0)%
свинец	(0,10-10,0)%
мышьяк	(0,10-10,0)%
ртуть	(0,10-10,0)%
кадмий	(0,10-10,0)%
сырая клейковина	(10,0-70,0) %
клетчатка	(0,10-50,0)%
жир	(1,0-60)%

зерновая примесь	(0-100,0) %
содержание фузариозных зерен	(0-100,0) %
содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой	(0-100,0) %
насыпная плотность	(0-10,0) т/м ³
натура	(400,0-900,0) г/л
белизна	(1,0-60,0) у.е.
число падения	(100,0-250,0) с
стекловидность	(0-100,0) %
Т-2 токсин	(0,0015- 0,15) мг/кг
охратоксин А	(0,0001 - 0,16) мг/кг
афлатоксин В1	(0,005 - 0,2) мг/кг
дезоксиниваленол	(0,005 - 5,0) мг/кг
ртутьорганические пестициды	(0,005 - 5,0) мг/кг
металломагнитная примесь	(0 - 50,0) мг/кг
зеараленон	(0,01 - 20,0) мг/кг
дрожжи и плесени	(0 - 100) КОЕ/г (см ³)
отбор проб	
вкус, запах, цвет, хруст	
развариваемость крупы	