

Программа проверки квалификации состава и свойств молока и молочной продукции

Показатель	Диапазон
антибиотики (тетрациклин, левомецетин, пенициллин, стрептомицин)	(0,0003-10,000) мг/кг
массовая доля влаги	(0,50-99,0) %
массовая доля хлористого натрия	(0-10,0) мг/кг
массовая доля белка	(0,10-100) %
массовая доля жира	(0,05-90,0) %
кислотность	(2,0-250,0) °Т
жирнокислотный состав жировой фазы	(0,4-35,0) %
перекисное число жира	(0,1-10,0) мг/кг
дрожжи и плесени	(0 - 100) КОЕ/г (см ³)
аммиак	(0,01 - 8,0) г/дм ³
перекись водорода	(0,5-50,0) %
фосфатаза	(0,1-10,0) %
массовая доля йода	(0,01-150,0) мг/кг
сахароза	(1,00-50,0) % (0,10-15,00) г/100г
лактоза	(2,00 - 60,00) %
бенз(а)пирен	(0,0001-2,0) мг/кг
Массовая доля 4,4'-ДДЭ	(0,1-5,0) мг/кг
Массовая доля α-ГХЦ	(0,1-5,0) мг/кг
Массовая доля β-ГХЦГ	(0,1-5,0) мг/кг
Массовая доля γ-ГХЦГ	(0,1-5,0) мг/кг
Массовая доля 4,4'-ДДТ	(0,1-5,0) мг/кг

Массовая доля 4,4'-ДДД	(0,1-5,0) мг/кг
Массовая доля свинца	(0,001-15,0) мг/кг
Массовая доля кадмия	(0,001-15,0) мг/кг
Массовая доля мышьяка	(0,001-15,0) мг/кг
Массовая доля ртути	(0,001-15,0) мг/кг
Массовая доля меди	(0,001-15,0) мг/кг
Массовая доля цинка	(0,001-15,0) мг/кг